

	Ordine: ungulati. Famiglia: cervidi.			Ordine: ungulati. Famiglia: bovidi.			Ungulati. Suidi
						Non cacciabile	Non cacciabile Veneto
	capriolo	daino	cervo	camoscio	muflone	stambecco	cinghiale
peso	20/25	100	150/300	30/45	30/40	100	80/200
denti	32	32	34	32	32	32	44
manto est	ross/giallo	ross/burno	ross/bruno	giallo/ross	Fulvo	grigioferro	nero
invernale	nerogrigio	ross/burno	brunorosso	nerobruno	Fulvo	grigioferro	nero
capezzoli	4	4	4	4	4	2	8/10/14
trofeo M	M F (0,2%)	M	M	M F	M F	M F	M F
posa	ott.nov.feb	apr.maggio	feb.marzo				
alimentaz	ruminante brucatore selettivo	ruminante pascolatore brucatore	ruminante pascolatore selettivo	Super-ruminante pascolatore bruc. selettiv	Super ruminante pascolatore	pascolatore selettivo	forte mangiatore onnivoro
habitat	Ecotoni bosco boscaglia	Boschi aperti	boschi ampi radure + acqua	rocce vegeta- zione arborea	Zone rocciose aperte	Zone sopra limite alberi	Boschi e sotto boschi + acqua
Neces- sità vitali	Fitto sotto bosco poca neve	Copertura arborea no neve	Acqua bosco	Rocce pendenza no disturbo	Poca neve	Clima continentale poche precipitazioni	Acqua nutrimento copertura
amori	Luglio agosto autunnale	Ottobre	Fine settembre Primi ottobre	Novembre Dicembre	Ottobre Novembre	Dicembre Gennaio	Novembre Febbraio
modalità	territorio	Area 2000/2500	harem	?	Maschio nei branchi di F	Corteggiamento e lotte	Maschio nei branchi di F
giorni gestazion.	280/290 160/170	229	226/236	180/190	150/160	165/170	114/119
parto	Mag.giug 1-3	Giugno 1- r 2	Mag.giu. 1-2	Mag. Giu. 1-2	Apr. Mar. 1-2	Giugno 1-2	Feb. Mag. 4-8

Scuola Faunistica Veneta: Ermete Pastorio; Claudio Rossi.